子どもの病気やけがの対処方法などの目安をお知らせし いざというとき落ち着いて対処していただけるように、奇 数月に「すこやか子育て健康情報」を掲載しています。記 事は、菊池郡市医師会の先生にご協力いただいています。

> 問い合わせ先 健康推進課健康推進係

小児の発熱の

肛門、

耳で測ることも

あります ます。

ます。 観察はしっかりする必要が

全身の状態の

あり

低めに出ます。

腋窩での体温は一般的に少

(腋窩)

で測られてい

多く

場合脇の

もが掛

いたしてですが、全身のがあれば必ずしも使用し掛けてください。解熱剤ぐため、適度に水分の補

解熱剤:

刑しなくて 烈剤は元気 が補給を心

脱水症

口下

特徴

水銀体温計で5分間以上測れ ですので、0・2℃程度の誤差 5分間の検温は難しいので、電 5分間の検温は難しいので、電 がよく使用されます。

悪寒のある場合にはまず体を顔が紅潮したら薄着にして熱を度が低いと悪寒を起こしますので周囲温度を上げてから行います。暖かいタオルで頭や体を拭くと、発汗した時のように気化くと、発汗した時のようにはまず体を

の中でも、最大1℃位の変動がい場合が多く、特に乳幼児では、小児は一般に大人より体温が高い児は一般に大人より体温が高くが高い訴えの一つです。 みられます 体温には日内周期があり、 ます。

できま

ਰ

耳式

度の誤差があっても十分に診断があります。臨床的にはこの程

待できます

外線センサー

ピンサーが正確に気体温計の場合、ホ

に向き合っ 鼓膜と赤

解

熱剤

の

す。その他にも☆ 低く、夕方にかけ も体温が 低く、 り、 以上が発熱の目安になります。 りすることもあり 、まわりの温度で左右された 浴後、激しく泣いた後などに 浴後、激しく泣いた後などに なるがにも食事後、運動後、 は温には日内周期があり、朝 ます。37·5℃ されたら発熱があると考えます。く、37・5℃以上の体温が確認られます。検温方法に問題がなていないと数値にばらつきが見

しょう。

発熱

ょう。解熱剤は病気を治してめ、解熱剤の乱用は避けま熱していることも考えられる発熱は、生体防御反応として

発熱は、

間だけ熱を下げ、

熱を下げるのではなく

、苦痛を軽減しはなく、一定時

楽にするための薬です。

ノフェン製剤(アンヒバ坐薬、用せず、原則としてアセトアミル、インダシン、ボルタレンな連性が指摘されているおのは使連性が指摘されているポンター

のです。 ルスや細菌などの感染による発熱の原因は、多くの場合ウ 感染以外にも、

の測

IJ

れます。

腫瘍などいろいろな場合にみら病、脱水症、白血病などの悪性

発熱時の対処の

(仕方

赤星医院 赤星一信 医師

染した場所の消毒には、

U

細菌、

ウイルス、

です。年間をと寄生虫が原因

素酸

感染性胃腸炎は、

さまざまな

おして発生しますが、で起こる感染症です。

例年初冬

④調理器具は十分な洗浄と消毒でしっかり加熱 中心温度が85ので注意してください)。 は、剤 は、塩素系と酸素系がありますが有効です(家庭用漂白剤素酸ナトリウム(塩素系漂白染した場所の消毒には、次亜塩やした場所の消毒には、次亜塩のが、ビニール袋などに入れ取り、ビニール袋などに入れり、ビニール袋などに入れり、ビニール袋などに入れり、ビニール袋などに入れり、ビニール袋などに入れり、ビニール袋などに入れり、ビニール袋などに入れる。

「語らい

の時間」

など。

き・

ところ

(火)

を 行 う

(5)]ウイルスに関す 厚生労働省ホ-関わらない 具合が悪い 3 る Q & ! 調理、 A ÿ

◆嘔吐などの点④38℃以上の高い

③元気がなく、

ぐっ

たり

してい

から増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまな。 「ロウイルスによるものです。ノロウイルスの感染経路は▼便や 「なが残っている場合▼乾燥したが、でから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えまから増加し始めピークを迎えません。

るとき

②顔色が悪く

苦しそうにして

るとき

の発熱があるとき

(5)

ŧ

Ż

うと

してい

ると

ノロウイルスに感染すると下

症状が い

るるときる出て頭痛

熱が

き 識 が

⑥ 苦 し

そうに呼吸を

して

いると

通痢、常

11~2日で回復しますが、嘔吐などの症状が出ます。

ご覧く

、ださい。

き

⑧ ⑦ひ強

い

腹痛を訴えるとき

い、見た目がおかしい。 このようにいつもと ⑧ひきつけを起こした

のかしい場合にはいつもと様子が違いのもと

受診しましょう。症状が消えてりますので、早めに医療機関に起こしたりすることがあ起こしたりすることがあるとがあります。

とき

ところ

2 月 1

要があります

さい

頃

は ょ

`病気を-

ま

後に手洗いを十分に行うなど他が排泄されますので、トイレのも便中には1週間程度ウイルス

• 1 月 30 号 日 的 研络 5 日 的 开格 5 日 的 5

修

ン

9

正午 セ

予防方法

おむ

処理

Ō

食事の の

時

問い合わせ先

☎096 (3333) 2
熊本県健康危機管理課

8

人への感染に注意が必要です

夜間でも救急外来を受診する必

配膳 午後22時 22

熊本大学医学部附属病午後2時~4時30分 記念館 病院山

会議室 天草地域健診4 セン 4 時 タ 2 階

泉まれた田た高な小は松を後に中な佐と ので原は林でみな藤ら村で藤う 悠で陽な翔が龍は悠で吐い桜で愛っ着で 翔と向た琉で樹き人だやが輝き作の空の

久米一)

月29日(火

献血にご協力ください

熊本県玉名地域振興局4階 · 後 1 時 日 30 金 分 後 4

時

お近くの会場にお越しくださ 大会議室

い (複数の会場 \sim の参加も可)

は、マに 開催します 肝炎患者サロン

を

合も1日3回の投与ではなく必ど)を使用します。使用する場アルピニー坐薬、カロナールな

す が、

ので、注意深く様子を見守

免疫力が付

いて

い

く過程で

②**嘔吐物・便などの**咽吐物の処理後など。

便などの取り

てください

注意す

る

処理をす

る

ペーパ

要な時のみとします

療機関受診

の

目安

に努めましょう! 感染性胃腸炎の感染予防

取り、, スクや

無料。 内 治療の話、 八患者 サロ 専門医から肝炎の最新 ⇒門医から ∪込みは不要です。 こる・入場 自由に情報交換す は 肝炎患者

る 爾

(敬称略)

上出田)

月9日・16日の歯

3歳児健診時「むし歯なし」の子

ツピーキツズ

し歯がなかった子科検診の結果で、む どもを紹介します。

歯 上赤星) 上西寺)

菊 菊 菊 袈裟尾) 上西寺)

立

爾 北宮 五海)

崎

 $\widehat{\oplus} \ \widehat{\oplus}$

<u></u> 東原団地) 永出分)

(a) (b) 朝日団地) 富の原西) 田島団地)

富の 富の原 原西)

です。今回むし歯がうったことるみで取り組むことがとても重要むし歯予防のためには、家族ぐ 診しましょう。 んは、なるべく早く歯科医院を受

29 | 広報きくち | 2013 January | *分*