

トマトキバガに対しては 以下の農薬を使用して防除を行ってください。

以下に記載した農薬はトマトキバガに対して登録はありませんが、植物防疫法第 29 条第 1 項の規定による防除を行うために使用が可能です。

また、使用にあたっては購入した農薬の適用作物、使用方法、使用時期、散布液量、希釈倍数使用量、使用回数を守ることで、出荷停止等、流通に支障が出ることもありません。

○トマト

農薬の種類	商品名	使用方法	希釈倍数使用量	使用時期	散布液量	本剤の使用回数	RAC コード
アクリナトリン・スピロメシフェン水和剤	クリアオール水和剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	3A 23
アクリナトリン水和剤	アーデント水和剤	散布	1000 倍	収穫前日まで	150～300L/10a	3 回以内	3A
イソキサチオン粉剤	カルホス粉剤	土壌表面散布土壌混和処理	6kg/10a	は種時又は植付時		2 回以内	1B
インドキサカルブ水和剤	トルネードエースDF ファイントリムDF	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	22A
エマメクテン安息香酸塩・ルフェスロン水和剤	アフアームエクセラ顆粒水和剤	散布	1500 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	6 15
エマメクテン安息香酸塩乳剤	アフアーム乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	5 回以内	6
クロマフェンジド水和剤	マトリックフロアブル	散布	1000～2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	18
クロラントラニプロール水和剤	プレバソンフロアブル5	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	28
クロラントラニプロール粒剤	プレバソン粒剤	株元散布	1g/株	育苗期後半～定植時		1 回	28
クロルフェナビル水和剤	コテツフロアブル	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	13
クロルフルアズロン乳剤	アタプロン乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	15
シアントラニプロール・チアメトキサム粒剤	ミネクトデュオ粒剤	株元散布	2g/株	鉢上げ時～育苗期後半		1 回	28 4A
シアントラニプロール水和剤	ベネビアOD	散布	2000～4000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	28
スピネトラム水和剤	ディアナSC	散布	2500～5000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	5
スピノサド水和剤	スピノエース顆粒水和剤	散布	5000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	5
ダイアジノン粒剤	ダイアジノン粒剤3	土壌混和	6～9kg/10a	は種時又は植付時		2 回以内	1B
ダイアジノン粒剤	ダイアジノン粒剤5	全面土壌混和又は作業土壌混和	4～6kg/10a	は種時又は定植時		2 回以内	1B
テトラニプロール水和剤	ヨーバルフロアブル	散布	2500～5000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	28
テフルベンズロン乳剤	ノーモルト乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	15
ノバルロン乳剤	カウンター乳剤	散布	2000～3000 倍	1 番花の開花まで	100～300L/10a	4 回以内	15
ピリダリル水和剤	プレオフロアブル	散布	1000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	UN
フルキサメタミド乳剤	グレーシア乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	30
フルフェノクスロン乳剤	カスケード乳剤	散布	2000～4000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	4 回以内	15
フルベンジアミドくん煙剤	フェニックスくん煙剤	くん煙	くん煙室容積 400m ³ (床面積 200 m ² ×高さ 2m) 当り 50 g	収穫前日まで		2 回以内	28
フルベンジアミド水和剤	フェニックス顆粒水和剤	散布	2000～4000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	28
ベルメトリン粒剤	ガードベイトA 野菜ひろばN	株元散布	3kg/10a	生育初期		3 回以内	3A
メタフルミゾン水和剤	アクセルフロアブル	散布	1000～2000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	3 回以内	22B
メトキシフェンジド水和剤	ファルコンフロアブル	散布	2000～4000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	2 回以内	18
ルフェスロン乳剤	マッチ乳剤	散布	2000～3000 倍	収穫前日まで	100～300L/10a	4 回以内	15

農薬の種類	商品名	使用方法	希釈倍数使用量	使用時期	散布液量	本剤の使用回数	RAC コード
レビメクチン乳剤	アニキ乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	6
還元澱粉糖化物・クロチア ニジン・ピリダリル・ベル メトリン・マンデストロピ ン水和剤	ベニカXネクストスプレー	散布	原液	収穫前日まで		2 回以内	4A 3A UN
脂肪酸グリセリド・スピノ サド水和剤	ダブルシューターSE	散布	1000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	5

○ミニトマト

農薬の種類	商品名	使用方法	希釈倍数使用量	使用時期	散布液量	本剤の使用回数	RAC コード
アクリナトリン・スピロメ シフェン水和剤	クリアオール水和剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	3A 23
アクリナトリン水和剤	アーデント水和剤	散布	1000 倍	収穫前日まで	150~300L/10a	2 回以内	3A
イソキサチオン粉剤	カルホス粉剤	土壌表面散布土 壌混和处理	6kg/10a	は種時又は植付 時		2 回以内	1B
エマメクチン安息香酸塩・ ルフェスロン水和剤	アフファームエクセラ顆粒水和剤	散布	1500 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	6 15
エマメクチン安息香酸塩乳 剤	アフファーム乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	5 回以内	6
クロマフェノジド水和剤	マトリックフロアブル	散布	1000~2000 倍	収穫 7 日前まで	100~300L/10a	3 回以内	18
クロラントラニプロール 水和剤	ブレバソフロアブル5	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	28
クロルフェナピル水和剤	コテツフロアブル	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	13
クロルフルアズロン乳剤	アタブロン乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	15
シアントラニプロール・ チアメトキサム顆粒剤	ミネクトデュオ顆粒剤	株元散布	2g/株	鉢上げ時~育苗 期後半		1 回	28 4A
シアントラニプロール水 和剤	ベネビアOD	散布	2000~4000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	28
スピネトラム水和剤	ディアナSC	散布	2500~5000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	5
スピノサド水和剤	スピノエース顆粒水和剤	散布	5000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	5
テトラニプロール水和剤	ヨーバルフロアブル	散布	2500~5000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	28
テフルベンズロン乳剤	ノーモルト乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	15
ノバルロン乳剤	カウンター乳剤	散布	2000~3000 倍	1 番花の開花ま で	100~300L/10a	4 回以内	15
ピリダリル水和剤	プレオフロアブル	散布	1000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	UN
フルキサメタミド乳剤	グレーシア乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	30
フルフェノクスロン乳剤	カスケード乳剤	散布	2000~4000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	15
フルベンジアミド水和剤	フェニックス顆粒水和剤	散布	2000~4000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	28
ベルメトリン顆粒剤	ガードベイトA 野菜ひろばN	株元散布	3kg/10a	生育初期		1 回	3A
メタフルミゾン水和剤	アクセルフロアブル	散布	1000~2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	22B
ルフェスロン乳剤	マッチ乳剤	散布	2000~3000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	15
レビメクチン乳剤	アニキ乳剤	散布	2000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	3 回以内	6
脂肪酸グリセリド・スピノ サド水和剤	ダブルシューターSE	散布	1000 倍	収穫前日まで	100~300L/10a	2 回以内	5